SORKIL G GRAINS

PRODUIT BIOCIDE
TP 14

AMM :
Pour les professionnels de la dératisation :
FR-2013-0111
Pour le grand public et les non professionnels de la dératisation :
FR-2013-1028

CONTIENT:
0,005% Difénacoum
Benzoate de Dénatonium (amérisant)

USAGES :
Lutte contre les rats et souris

TYPE :
Appât sur grain.
Grains de froment décortiqué

DURÉE DE CONSERVATION :
2 ans

ANTIDOTE :
Vitamine K1

CONDITIONNEMENT :
Amateurs : Inf à 1,5kg et en sachets

Professionnels :
Sachet de 25g (cartons de 12.5 kg)
Sachet de 50 g (carton 15 kg)
Sachet de 100 g (carton de 10 kg)

Sac de 25 kg de vrac

SORKIL G GRAINS s'utilise pour la lutte contre les rongeurs nuisibles à l'intérieur et autour des bâtiments privés, publics et agricoles.
Appât rodonticide sur grain de froment de qualité, *décortiqué et traité contre la germination.* La qualité du grain choisi le rend particulièrement appétent.
Le SORKIL G GRAINS ne doit être utilisé que dans des *POSTES D'APPÂTAGE SECURISES*

ACTION.

Les appâts à base de difénacoum tuent les rongeurs en ralentissant leur capacité de coagulation du sang. Les rongeurs meurent en général 3 à 11 jours après ingestion de l'appât sans éveiller la méfiance des autres rongeurs. Comme les cadavres dessèchent en général, ils émettent moins d'odeurs désagréables.

DOSAGE ET MODE D'EMPLOI

Le nombes de poste d'appâtage est fonction du site du traitement, du contexte géographique, de l'importance et de la gravité de l'infestation.

Rats **:** postes de 80 à 200 g d'appât le long des parois dans les lieux infestés et sur les parcours. Intervalle entre 2 postes pour une infestation moyenne : 15 m.

Souris : postes de 25–30g d'appât le long des parois dans les lieux infestés et sur les parcours. Intervalle entre 2 postes pour une infestation moyenne : 3 m.

Contrôle: Inspecter et réapprovisionner les boites d'appâtage durant la période de traitement, quelques jours après application puis une fois par semaine tant que l'appât est consommé.
Placer les boites d'appâts en zone non submersible et à l'abris des intempéries.
Retirer les boites d'appâts à la fin du traitement.

PRECAUTIONS

Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
Conserver hors de la portée des enfants.
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.
Ne pas disposer sur des surfaces et des ustensiles qui pourraient être en contact avec les aliments afin d'éviter toute contamination des aliments destinés à la consommation humaine et animale.
Stocker le produit à l'abris de la lumière.
Conserver uniquement dans le conditionnement d'origine.
Les boites d'appât ne doivent pas être utilisées pour contenir d'autres produits

EDIALUX
ZA MACON EST—01750 REPLONGES
Tel : 03.85.31.89.10—Fax : 03.85.31.89.11—
email : info@edialux.com site : www.edialux.fr

Version 10/2013

SORKIL G GRAINS

PRODUIT BIOCIDE
TP 14

AMM :
Pour les professionnels de la dératisation :
FR-2013-0111
Pour le grand public et les non professionnels de la dératisation :
FR-2013-1028

CONTIENT:
0,005% Difénacoum
Benzoate de Dénatonium (amérisant)

USAGES :
Lutte contre les rats et souris

TYPE :
Appât sur grain.
Grains de froment décortiqué

DURÉE DE CONSERVATION :
2 ans

ANTIDOTE :
Vitamine K1

CONDITIONNEMENT :
Amateurs : Inf à 1,5kg et en sachets

Professionnels :
Sachet de 25g (cartons de 12.5 kg)
Sachet de 50 g (carton 15 kg)
Sachet de 100 g (carton de 10 kg)

Sac de 25 kg de vrac

que des rodenticides.
Empêcher l'accès aux appâts par les enfants ainsi que par les animaux domestiques et les animaux non cibles.

Ne pas utiliser le produit dans les zones où des cas de résistance sont suspectés ou établis.
Ne pas appliquer le produit directement dans les terriers
Ne pas ouvrir les sachets.
Se laver les mains après utilisation.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Recommandation pour les professionnels de la lutte contre les rongeurs
Le port de gants est recommandé
Porter un équipement de protection respiratoire lors du transvasement des grains en vrac

ANTIDOTE.

L'antidote des anticoagulants est la vitamine K1. L'administration de l'antidote doit se faire sous contrôle médical.

EFFETS SECONDAIRES DÉFAVORABLES :

Les symptômes les plus importants d'intoxication par ingestions sont : épistaxis et saignements au niveau des muqueuses buccales, apparition d'hématomes multiples ou étendus, hémorragies, sang dans les urines, augmentation du temps de coagulation.

« Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. ».

Consulter la fiche de données de sécurité sur www.edialux.fr/
pour toutes les précautions et premiers secours afférents à ce produit.

EDIALUX
ZA MACON EST—01750 REPLONGES
Tel : 03.85.31.89.10—Fax : 03.85.31.89.11—
email : info@edialux.com site : www.edialux.fr

Version 10/2013